



brócoli y coliflor

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: en el primer riego localizado.

Dosis: 5 L/Ha.

2ª aplicación foliar: cuando se empieza a formar el racimo (pella) que suele ser un mes después de la 1ª aplicación (plantación). Es cuando comienzan las máximas necesidades de Nitrógeno en la planta. Es compatible con otros productos que se puedan aplicar en ese momento.

Dosis: 3 L/Ha.

Recomendamos el uso de **CORRIZ-AM**® acompañando a **BROTOMAX**® en la primera aplicación.

Dosis: 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mayor desarrollo de la raíz y un mejor asentamiento en el terreno.
- Más vigor.
- Incremento de peso.
- Con la aplicación foliar se consigue incrementar el tamaño de las hojas de cubrimiento, cerrando mejor.
- Mayor resistencia a las podredumbres y enfermedades de cuello (*Sclerotinia*, *Pythium*...).
- Mejor conservación en el almacenamiento, obteniendo plantas más resistentes a las pudriciones blandas bacterianas y a los ablandamientos acuosos causados por hongos.

RECOMENDACIONES:

- En casos de encharcamientos prolongados provocados por lluvias intensas, la aplicación de **BROTOMAX**®, al ser compatible con los cobres y fungicidas específicos, ayuda de forma espectacular a la recuperación de las plantas supervivientes.

Dosis: 3 L/Ha.

- Con la pella ya formada se recomienda la aplicación de **QUASSAR**® para evitar la formación de rocío facilitando su secado y evitando posteriores podredumbres.

Dosis: 0,15-0,25%

- Recomendamos el empleo de **BIOHIDRAMAR**® **CREMA** que actúa como vehiculador de los productos fitosanitarios.

Dosis (vía foliar): 2 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®