



hortícolas

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: a los 7-10 días del trasplante.

Dosis: 3 cc/L.

2ª aplicación foliar: 15-20 días después, o antes de la floración.

Dosis: 3 cc/L (invernadero o al aire libre).

3ª aplicación foliar: tras la primera recolección. Puede aplicarse con fungicidas específicos.

Dosis: 3 cc/L.

Aplicaciones foliares subsecuentes: Puede aplicarse cada 12-18 días mientras lo permita la rentabilidad del cultivo.

BROTOMAX® puede ser aplicado en toda clase de cultivos hortícolas (**tomate, pepino, calabacín, pimiento, berenjena,...**) tanto al aire libre como en invernadero. También puede ser aplicado en **riego por goteo**, a la dosis de 3-5 L/Ha.

En semilleros, emplear en pulverización foliar con 2-3 hojas verdaderas.

Dosis: 2 cc/L.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mejora la distribución de las raíces en el bulbo de riego y fuera de él.
- Mayor y más equilibrado desarrollo del cultivo (mejor diferenciación floral, cuajado y mayor producción).
- Como en cualquier cultivo en el que tenemos al mismo tiempo flores y frutos en desarrollo, **BROTOMAX®** regula el ciclo vegetativo, aportando la energía que la planta demanda en las situaciones más críticas.
- Mantiene el nivel de producción en las épocas de menos horas luz.
- La primera aplicación evitará pudriciones del "cuello" y dará más vigor a la planta, consiguiendo un mejor enraizamiento y asentamiento en el terreno definitivo.
- Con las aplicaciones de **BROTOMAX®** superaremos claramente el "colapso" o "muerte súbita" de las plantas, típico declive de muchas hortícolas tras el trasplante o el cuajado.
- Mejora rápidamente la cicatrización de las heridas en la planta tras la recogida del fruto.
- Debido al efecto antioxidante que presenta **BROTOMAX®**, las plantas tratadas permanecen jóvenes durante más tiempo, alargando el ciclo vegetativo y permitiendo más cortes.
- Incrementa el contenido de compuestos fenólicos en las plantas, haciéndolas más resistentes a enfermedades fúngicas y bacterianas.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®



hortícolas

RECOMENDACIONES:

A principios de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la aplicación de **CORRIZ-AM**[®]. Conseguiremos mayor proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular, por lo que obtendremos un mejor establecimiento de las plantas y nos ayudará a superar dichos momentos causados por agentes bióticos y abióticos durante el ciclo del cultivo

Dosis (vía riego): 3 L/Ha.

Se recomienda realizar aplicaciones foliares **BIOHIDRAMAR**[®] **CREMA** con el objetivo de conseguir una homogeneización de la floración, cuajado y engorde así como superar momentos de estrés en los siguientes cultivos hortícolas: tomate, pimiento, pepino, berenjena y calabacín.

Dosis: 2 cc/L.

En tomate, pimiento y calabacín se recomienda **LANZADERA**[®] **COBRE** de manera preventiva para fortalecer la planta ante ataques de agentes patógenos.

Dosis: 3 cc/L (vía foliar).

2-3 L/Ha (vía riego).



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX[®]