



judía verde

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª Aplicación foliar: a los 10 días de la siembra.

Dosis: 3 cc/L

2ª Aplicación foliar: 15-20 días después.

Dosis: 3 cc/L

3ª Aplicación foliar: tras la primera recolección. Puede aplicarse con fungicidas específicos.

Dosis: 3 cc/L

Aplicaciones foliares subsecuentes: Puede aplicarse cada 12-18 días mientras lo permita la rentabilidad del cultivo.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- La primera aplicación evitará pudriciones del "cuello" y dará más vigor a la planta, consiguiendo un mejor enraizamiento y asentamiento en terreno definitivo.
- Mayor y más equilibrado desarrollo del cultivo (mejor diferenciación floral, cuajado y mayor producción).
- Mejora la nodulación de las raíces.
- Tallos más fuertes y resistentes al frío.
- Hace a la planta más fuerte frente a ataques de Alternaria.

- Mantiene el nivel de producción en las épocas de menos horas luz.
- Mejora rápidamente la cicatrización de las heridas en la planta tras la recogida del fruto.
- Debido al efecto antioxidante que presenta **BROTOMAX**[®], las plantas tratadas permanecen jóvenes durante más tiempo, alargando el ciclo vegetativo y permitiendo más cortes.

RECOMENDACIONES:

A principios de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la aplicación de **CORRIZ-AM**[®]. Conseguiremos mayor proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular, por lo que obtendremos un mejor establecimiento de las plantas y nos ayudará a superar dichos momentos causados por agentes bióticos y abióticos durante el ciclo del cultivo.

Dosis (vía riego): 3 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX[®]