



# melón y sandía

## MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

**1ª aplicación:** a los 10 días de la plantación.

**2ª aplicación:** a los 15 días de la 1ª aplicación.

**3ª aplicación:** tras el cuajado.

**Dosis (vía foliar):** 0,3%.

**Dosis (vía suelo):** 5 L/Ha.

## BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Mayor precocidad.
- **BROTOMAX®** regula el ciclo vegetativo, aportando la energía que la planta demanda en cada momento.
- Debido al efecto antioxidante que presenta **BROTOMAX®**, las plantas tratadas permanecen jóvenes durante más tiempo, alargando el ciclo vegetativo y permitiendo más cortes.
- Con la 3ª aplicación de **BROTOMAX®** superaremos claramente el “colapso” del melón.
- **BROTOMAX®** estimula la producción de polifenoles, haciendo a la planta más resistente a “enfermedades de cuello”.
- Se consiguen frutos más aromáticos y con un mayor nivel de azúcares (Grados Brix).

## RECOMENDACIONES

Si, tras realizar la primera aplicación de **BROTOMAX®**, observamos la planta con falta de color o crecimiento retrasado, recomendamos realizar una **aplicación vía riego** de **CORRIZ-AM®** a los 7 días de la primera aplicación de **BROTOMAX®**.

**Dosis:** 3 L/Ha.

Para una mejor y más rápida cicatrización de las heridas producidas tras cada corte, recomendamos realizar una aplicación foliar de **BROTOMAX®** mientras que la rentabilidad del cultivo lo permita.

Recomendamos realizar una **aplicación foliar** de **BIOHIDRAMAR® CUAJE** al comienzo de floración para mejorarla y lograr un mayor número de flores uniformes y fértiles, aumentando así mismo la calidad del polen.

**Dosis:** 0,1 % (1 cc/L)



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**



# melón y sandía

Recomendamos realizar una **aplicación** conjunta de **AM-EN®** y **BIOHIDRAMAR® CREMA** cuando el melón alcanza el tamaño de un huevo y la sandía el de una pelota de tenis.

- La aplicación de **AM-EN®** evita el aborto de frutos y da uniformidad de tamaño, es decir, hace que la planta saque adelante un mayor nº de frutos con uniformidad de los mismos.

**Dosis (vía foliar):** 0,3 % (3 cc/L).

- La aplicación de **BIOHIDRAMAR® CREMA** provoca el relleno de las células y hace que el fruto pese más.

En el caso de que se produzcan varias floraciones con los consiguientes cuajados, repetir este tratamiento en el mismo momento.

**Dosis (vía foliar):** 0,2 % (2 cc/L).



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**