



olivo

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación foliar: durante todo el proceso de diferenciación de las yemas de brotación vegetativa. Puede hacerse coincidir con el tratamiento contra repilo.

Dosis: 0,3%.

2ª aplicación foliar: : desde la floración hasta el final del cuajado de los frutos. Puede hacerse coincidir con el tratamiento de primavera para prays.

Dosis: 0,3%.

3ª aplicación foliar: aproximadamente un mes antes de la recolección.

Dosis: 0,3%.

Puede ser también aplicado **vía suelo** en los mismos momentos.

Dosis: 5 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

PRIMERA APLICACIÓN:

- Mayor número de yemas latentes brotadas.
- Estimula la vegetación. Mejor revestimiento del árbol.
- Aumenta el contenido en polifenoles, incrementando así la capacidad de autodefensa por lo que ayudamos a convivir con enfermedades vasculares.

Relacionado con la calidad del aceite, la segunda y tercera aplicación:

- Aumentan la capacidad antioxidante del aceite, estabilizándolo y prolongando su vida.
- Aumentan el rendimiento graso de la aceituna.
- Potencian las propiedades organolépticas varietales..

RECOMENDACIONES:

Recomendamos la aplicación vía foliar de **LANZADERA® 3** para prevenir o corregir eficazmente los estados carenciales de Zinc, Manganeseo y Magnesio.

Dosis: 0,2 - 0,3% (2-3 L / 1000 L)

Recomendamos realizar la tercera aplicación de **BROTOMAX®** añadiendo **LANZADERA® POTASIO** para potenciar la maduración y engorde del fruto.

Dosis: 2,5 - 3L/Ha.

Recomendamos en casos de fuerte ataque de *Verticillium*, *Phytophthora*, etc. aplicar **BROTOMAX®** mojando bien el tronco y ramas.

Dosis: 5 L/Ha.



olivo

TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN:

- Produce una rápida cicatrización de las micro-heridas producidas por la recolección, frenando la entrada de enfermedades vasculares y de bacterias como la *Tuberculosis*.
- Induce la lignificación de los tejidos vegetales, dificultando la penetración del mosquito de la corteza.
- Consigue una menor caída de hoja.

Dosis foliar: 0,3%

NUEVAS PLANTACIONES

Con los objetivos de conseguir:

- Mejor enraizamiento (menor nº de pérdidas)
- Plantas más vigorosas
- **Reducción en el tiempo de entrada en producción**

En nuevas plantaciones recomendamos realizar dos aplicaciones vía suelo de **CORRIZ-AM®**, una el momento del trasplante y otra a los 7-10 días.

Beneficios:

- Provoca la proliferación de **pelos absorbentes** y una **mayor masa radicular**.
- Genera una mejora vegetativa y un **mayor diámetro del tronco**.
- Potencia la multiplicación y prolongación de las raíces.
- Favorece la micorrización.

Dosis: 5 L/Ha (±10 cc/pie).

A continuación de estas aplicaciones se realizarán dos aplicaciones vía suelo consecutivas de **BROTOMAX®** espaciadas una de otra entre 7 y 10 días.

Beneficios:

- Estimula la brotación produciendo un mayor nº de brotes y más vigorosos.
- Mejor revestimiento del plantón.
- Mayor altura de planta.
- Fortalece el entallado sin reblandecerlo (planta más resistente al frío)

Dosis: 5 L/Ha (±10 cc/pie).

Una vez finalizado el Programa de Establecimiento anteriormente expuesto, recomendamos realizar una aplicación al mes de **BROTOMAX® vía suelo** durante el periodo de actividad vegetativa de la planta (entre marzo y octubre).

Cuando la planta alcance un buen volumen foliar, esta aplicación se puede realizar vía foliar.

Dosis: 5 L/Ha (**vía riego**)

0,3% (3 L/1000 L) (**vía foliar**)

Este tratamiento es perfectamente compatible con aminoácidos, complementos nutricionales, tratamientos fitosanitarios, etc.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®