



patata

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: cuando la planta tenga de tres a cuatro hojas.

Dosis: 1,5 L/Ha (vía foliar) o 5 L/Ha (vía suelo).

2ª aplicación: entre 20 y 30 días después de la 1ª aplicación.

Dosis: 3 L/Ha (vía foliar) o 5 L/Ha (vía suelo).

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- La primera aplicación contribuirá a un buen establecimiento de la planta. Mejor enraizamiento.
- Buen equilibrio vegetativo (aéreo y radicular).
- Se observa un mayor incremento medio del rendimiento de cosecha.
- Favorece el engrosamiento de los tubérculos.
- Contribuye a la acumulación de almidón en los tubérculos.
- Mejora la conservación.
- Protección contra el ataque de hongos vasculares (*Phytophthora infestans...*)

OBSERVACIONES:

No aplicar **BROTOMAX**® a partir del inicio de la floración, ya que mantendríamos la planta de patata demasiado joven y retrasaría la tuberización.

RECOMENDACIONES:

Recomendamos usar **BROTOMAX**® mezclado con los fungicidas específicos que actúan contra el *mildiu*, para potenciar la eficacia de los mismos.

BROTOMAX® no controla el *mildiu*, pero contribuye en su lucha al mejorar significativamente el sistema de defensa de la planta, haciéndola más vigorosa y resistente a los daños producidos por la enfermedad.

Dosis: 1,5 L/Ha (foliar).

Recomendamos realizar aplicaciones continuas de **LANZADERA**® **POTASIO** cuando quede un mes para la recolección con el objetivo de incrementar el calibre de los tubérculos.

Dosis: 3 L/Ha (vía foliar) o 5 L/Ha (vía suelo).



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTOMAX®