



# peral y manzano

## MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

**1ª aplicación foliar:** 90% de caída de pétalos.

**Dosis:** 3 L/Ha

**2ª aplicación foliar:** unos 40 días después de la primera aplicación.

**Dosis:** 3 L/Ha

**3ª aplicación foliar:** 25-30 días antes de la recolección.

**Dosis:** 3 L/Ha

Puede ser también aplicado vía suelo en los mismos momentos.

**Dosis:** 5 L/Ha

## BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Asegura una buena y uniforme brotación, mejor revestimiento del árbol.
- Ayuda a superar los problemas de afinidad patrón-variedad (Williams, Conference, Ercolini, Limonera...)
- Fortalece los mecanismos de autodefensa del árbol para superar el ataque de *Phytophthora* spp.
- Superar el secado de yemas, bien debido a *Pseudomonas* o a un desorden fisiológico.
- Evita el secado de hojas en verano de variedades sensibles como Conference, Williams..., la aplicación de **BROTOMAX**® protege a la clorofila de la oxidación.
- Regeneración de corteza dañada por chancro.
- Mayor calidad en la piel del fruto, mejora su consistencia.

- Aumenta el tamaño del fruto. Uniformidad de calibres.
- Mejor conservación del fruto.

## TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

### Tratamiento en Peral para amarrar más fruto y evitar la caída fisiológica del mismo

Con la aplicación de **BROTOMAX**®, aportamos los nutrientes y energía necesaria para que el árbol amarre más frutos, obteniendo de esta manera altas producciones.

**1ª aplicación:** caída de pétalos.

**2ª aplicación:** a los 7 días de la 1ª aplicación

**Dosis:** en aplicación foliar a 3 L/Ha y en aplicación vía suelo a 5 L/Ha.

### Tratamiento en presencia de Fuego Bacteriano (*Erwinia amylovora*)

**1ª aplicación:** caída de pétalos.

**2ª aplicación:** a los 15-20 días de la 1ª aplicación.

**3ª aplicación:** 30 días antes recolección.

**4ª aplicación:** después de recolección

**Dosis:** en aplicación foliar a 3 L/Ha y en aplicación vía suelo a 5 L/Ha.

### Granizo

Rápida cicatrización de las heridas producidas.

**Dosis:** 3 L/Ha.



# peral y manzano

## RECOMENDACIONES:

Recomendamos la aplicación vía foliar de **LANZADERA® 3** para prevenir o corregir eficazmente los estados carenciales de Zinc, Manganeso y Magnesio.

**Dosis:** 0,2 - 0,3% (2-3 L / 1000 L)

En variedades de manzano sensibles al Bitter pit, con la aplicación conjunta de **BROTOMAX®** y **LANZADERA® CALCIO** al 0,3% (3 L/1000 L) se consiguen excelentes resultados en el control de este problema fisiológico.

Usar en el tercer tratamiento **LANZADERA® POTASIO**, para aumentar el tamaño del fruto.

**Dosis:** 1,5-2 L/Ha.

En caso de fuerte ataque de mal de cuello (*Phytophthora*), realizar una aplicación postcosecha. Además, se acumulan reservas para la próxima brotación.

**Dosis:** 0,3% (3 L/1000 L).



AGROMÉTODOS, S.A.



**BROTOMAX®**