



aguacate

MOMENTOS, MODO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

1ª aplicación: desde yema de invierno.

2ª aplicación: maduración.

3ª aplicación: en post-cosecha.

Dosis:

vía foliar: 3 L/Ha.

vía riego: 5-6 L/Ha.

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Incremento del número de yemas brotadas.
- Asegura una buena estimulación de las brotaciones. Buen equilibrio entre vegetación (superficie foliar) y número de flores, mejor revestimiento del árbol.
- Fortalece los mecanismos de autodefensa del árbol para superar el ataque de *Phytophthora* spp.
- Uniformidad de los frutos y maduración más homogénea.
- Mayor calidad en la piel del fruto, mejora su consistencia.
- Aumenta el tamaño del fruto. Uniformidad de calibres.
- Mejor conservación del fruto.
- Con el tratamiento post-cosecha garantizamos un aumento de las reservas de cara a la siguiente campaña.

RECOMENDACIONES:

Realizar una aplicación de **BIOHIDRAMAR® CUAJE** a partir de inicio de floración hasta pétalos visibles para favorecer el potencial fructífero del cultivo. Con esta aplicación se aumenta la calidad del polen y el número de flores uniformes y fértiles, por lo que obtendremos un mayor cuajado de los frutos.

Dosis (vía foliar): 0,1% (1 L/1000L).

Recomendamos realizar varias aplicaciones de **AM·EN®** desde fruto tamaño canica hasta tamaño huevo (cada 15-21 días aproximadamente) para favorecer

el engorde de los mismos. Además, se favorece el agarre de los frutos, se consigue una mayor homogeneidad de los calibres y una mejora en la calidad de los frutos.

Dosis (vía foliar): 0,3% (3 L/1000 L).

Se recomienda usar **LANZADERA® CALCIO** para conseguir aumentar la calidad y la vida útil de los frutos.

Dosis:

vía foliar: 0,3% (3 L/1000 L) o

vía riego: 5 L/Ha.

Recomendamos realizar aplicaciones de **LANZADERA® POTASIO** para potenciar la maduración y engorde del fruto.

Dosis:

vía foliar: 0,25% (2,5 L/1000 L) o

vía riego: 5 L/Ha.

Para mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios y nutricionales, se recomienda la mezcla con **QUASSAR®** por su alto poder tensioactivo, adherente y penetrante.

Dosis foliar: 0,2-0,3%.

A principio de la plantación y en los momentos de estrés recomendamos la aplicación de **CORRIZ·AM®**, con la que conseguiremos:

- Proliferación de pelos absorbentes y una mayor masa radicular.
- Genera una mejora vegetativa y un mayor diámetro del tronco.
- Ayudará a superar momentos causados por agentes bióticos y abióticos.
- Potencia la multiplicación y la prolongación de las raíces.
- Favorece la micorrización.

Dosis (vía riego): 5 - 6 L/Ha.



AGROMÉTODOS, S.A.



BROTO MAX®